



AGROZERO Leciactiv

**Solución fungicida
con acción superficial y cicatrizante
de tejidos vegetales**



**LOS COMPUESTOS ACTIVOS DEL FORMULADO
PENETRAN EL TEJIDO VEGETAL PARA
HIDRATARLO Y REFORZARLO FACILITANDO
SU RÁPIDA CICATRIZACIÓN.**



**EFFECTO PROTECTOR DE LOS COMPUESTOS
ACTIVOS APLICADOS, MEJORANDO
ADHERENCIA, COBERTURA Y RESISTENCIA A
OXIDACIONES DE LOS INGREDIENTES.**



**CREACIÓN DE UNA MEMBRANA DE GRASA
VEGETAL ENCIMA DEL CULTIVO
QUE PROTEGE EL CULTIVO
DE AGRESIONES EXTERNAS.**

AGROZERO LECIATIV es un formulado líquido a base de lecitina de soja que **refuerza la pared celular de los tejidos vegetales para dificultar la colonización por hongos**. Por una parte, penetra las células engrosando su pared celular y promoviendo su **rápida cicatrización** para ralentizar el enraizamiento de esporas de hongos patógenos. Por otra parte, crea una membrana protectora de grasa vegetal encima del cultivo que **repele el agua de la superficie del cultivo** durante unos días después de aplicación para dificultar el desarrollo de hongos cancelando su condición principal de desarrollo, la humedad relativa.

Además, cuando AGROZERO LECIATIV se aplica en conjunto con otros productos, **mejora la efectividad de la aplicación**, ya que los ingredientes activos quedan encapsulados dentro de la grasa vegetal que lo compone, permitiendo una **mejor adherencia y un aumento del tiempo de secado** del tratamiento, así como una **protección contra oxidaciones** prematuras de los compuestos lo que garantiza su máxima eficacia.

Denominación tipo: Sustancia básica - Lecitinas para uso en agricultura

Contenido declarado

	p/p
Lecitina de soja	20%

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento/Norma vigente sobre producción y etiquetado de fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo.

Aprobado para su uso en producción orgánica NOP.

Certificaciones ecológicas



Dosis y modo de empleo (SANCO/12798/2014 - Rev. 3)

AGROZERO LECIACTIV es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y productos nutricionales presentes en el mercado. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa. Para más información solicite la guía de usos a su técnico de confianza.

APLICACIÓN FOLIAR: 3-5 cc/L. Pulverización foliar de 1 a 8 aplicaciones espaciadas de 7 días.

Cultivo	Enfermedad
Frutales pepita	<i>Podosphaera leucotricha</i> (oidio).
Frutales hueso	<i>Taphrina deformans</i> (lepra).
Lechuga	<i>Erysiphe cichoracearum</i> (oidio).
Pepino	<i>Podosphaera xanthii</i> (oidio).
Tomate y patata	<i>Phytophthora infestans</i> (mildiu).
Endivia	<i>Alternaria cichorii</i> (alternaria).
Ornamentales	Todo tipo de hongos patógenos.
Viña	<i>Plasmopara viticola</i> (mildiu), <i>Erysiphe necator</i> (oidio).
Grosella	<i>Microsphaera grossulariae</i> (oidio).
Frambuesa	<i>Sphaerotheca macularis</i> (oidio), <i>Pucciniastrum americanum</i> (roya).
Fresa	<i>Podosphaera aphanis</i> (oidio), <i>Phytophthora fragariae</i> (mildiu).

Instrucciones de almacenaje y manipulación

Manténgase resguardado del sol y de la humedad.

Temperatura de almacenamiento: 5°C - 35°C.