



AGROZERO Quitactiv

**Solución de clorhidrato de quitosano
para estimulación de las defensas
naturales de las plantas**



**RESISTENCIA A LAS INFECCIONES POR
HONGOS Y BACTERIAS PATÓGENOS
RETRASANDO LA APARICIÓN DE DAÑOS
Y EVITANDO PÉRDIDAS DE RENDIMIENTO.**



**GRACIAS A SU GRAN CAPACIDAD
PARA PENETRAR EN LA PLANTA PERMITE
SU APLICACIÓN TANTO VÍA FOLIAR
COMO POR FERTIRRIEGO.**



**ACTIVACIÓN DE LOS METABOLISMOS
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LOS
CULTIVOS A LA VEZ PARA PROMOVER
CRECIMIENTO Y PROTECCIÓN.**



**PRODUCTO NATURAL ALTAMENTE
RESPETUOSO QUE NO CREA RESIDUOS
EN LA COSECHA MINIMIZANDO
SU IMPACTO AMBIENTAL.**

AGROZERO QUITACTIV es un concentrado de clorhidrato de quitosano obtenido por un proceso de deacetilación de α -quitina proveniente del caparazón de crustáceos. Esta misma quitina se encuentra en la pared celular de hongos patógenos y en el caparazón de insectos, lo que genera una reacción de **defensa natural de las plantas** al entrar en contacto con el tejido vegetal. Al no poder identificar el tipo de problemas al cual enfrentarse, los cultivos generan unos compuestos antimicrobiales genéricos que le proveen con una **protección contra cualquier tipo de agresiones**.

Además, el quitosano, es un activador metabólico que **estimula un crecimiento acelerado de los cultivos** sin aporte de nitrógeno que ablandaría los tejidos. Igualmente, la quitinasa contenida en AGROZERO QUITACTIV promueve específicamente la producción de lignina, calosa y suberina que actúan como una **barrera natural contra la infección por patógenos**.

Denominación tipo: Sustancia básica - Clorhidrato de quitosano para uso en agricultura

Contenido declarado

	p/p
Clorhidrato de quitosano	5%

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento/Norma vigente sobre producción y etiquetado de fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo.

Certificaciones ecológicas



Dosis y modo de empleo (SANCO/12388/2013 - Rev. 2)

AGROZERO QUITACTIV es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y productos nutricionales presentes en el mercado. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa. Para más información solicite la guía de usos a su técnico de confianza.

APLICACIÓN FOLIAR: 3 cc/L. Realizar 2 aplicaciones espaciadas de 2 a 3 semanas.

APLICACIÓN FERTIRRIEGO: 3-5 l/ha. Realizar 2 aplicaciones espaciadas de 2 a 3 semanas.

Cultivo	Enfermedad
Berries	<i>Elicitor de defensas naturales contra enfermedades fúngicas y bacterianas</i>
Hortícolas	
Cultivos extensivos (cereales, leguminosas...)	

Instrucciones de almacenaje y manipulación

Manténgase resguardado del sol y de la humedad.

Temperatura de almacenamiento: 5°C - 35°C.