



EFISOIL

DORMIA

Activador fisiológico y estimulador brotacional para cultivos caducifolios



ACTIVA LOS MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS DEL SUELO INCREMENTANDO SU FERTILIDAD Y REGENERANDO SU POTENCIAL NUTRICIONAL.



EL APOORTE DE AMINOÁCIDOS SELECCIONADOS AUMENTA LA ASIMILACIÓN Y TRASLOCACIÓN DE LOS NUTRIENTES APORTADOS Y MOVILIZA LOS PRESENTES EN EL SUELO.



OFRECE UN RÁPIDO APOORTE ENERGÉTICO QUE ACTIVA EL CRECIMIENTO VEGETAL Y MEJORA EL DESARROLLO GENERAL DE LA PLANTA EN LAS FASES DE ARRANQUE POSTERIORES A LA PARADA VEGETATIVA DEL INVIERNO.



ACTIVA LA ROTURA DE LA DORMANCIA Y PROMUEVE UNA BROTAÇÃO INICIAL DE YEMAS Y UNA FLORACIÓN DEL CULTIVO MÁS UNIFORME.



PROTEGE FRENTE AL ESTRÉS ANTICIPÁNDOSE A LA ACCIÓN DE FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS QUE DISMINUYEN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO.

EFISOIL DORMIA es un **bioestimulante** que **favorece la brotación de las yemas y la floración**. Su aplicación incrementa la capacidad vegetativa, aumentando el número de frutos y la viabilidad de los mismos. Ofrece un efecto antiestrés que acorta los periodos de inactividad provocados por causas abióticas, actuando como un acelerador del metabolismo vegetal.

EFISOIL DORMIA **activa la rotura de la dormancia, y promueve una brotación más uniforme y temprana** en regiones con inviernos suaves, donde de manera natural no hay suficientes horas de frío para satisfacer las necesidades del cultivo. Una correcta aplicación aumenta el número de yemas brotadas, lo que se traduce en un importante incremento del rendimiento.

En todos los cultivos caducifolios, su aplicación **mejorará la floración, brotación y adelanto de la cosecha**, aunque hayan sido satisfechas las horas de frío necesarias.

Denominación tipo: Abono especial con aminoácidos

Contenido declarado

	p/p
Aminoácidos libres	55%
Nitrógeno (N) total	10%
Nitrógeno (N) orgánico	9%
Nitrógeno (N) amoniacal	1%
pH	5

Patentes aplicadas al producto

• EP3561066B1

Dosis y modo de empleo

APLICACIÓN MEDIANTE EL AGUA DE RIEGO: Puede aplicarse a todos los cultivos, ajustando su dosificación a las características del terreno, las necesidades y el rendimiento. Utilizar la dosis recomendada más alta en los casos de evidente posibilidad de falta de condiciones relacionadas con las horas de frío. Viértase primero el agua en el depósito o recipiente de mezcla y posteriormente incorpórese el producto agitándolo continuamente. Diluir para preparar la solución madre a una concentración entre el 5-10%, modificable en función de la calidad del agua disponible. En la solución nutritiva la concentración media no debe superar 1-2 g/l.

Cultivo	Dosis total	Aplicaciones
Uva de mesa y uva de vinificación	25-35 días antes del movimiento de yemas	10-14 kg/ha
Melocotón y nectarina	20-30 días antes del movimiento de yemas	5-8 kg/ha
Cerezo, albaricoque, manzano y peral	20-30 días antes del movimiento de yemas	7,5-10 kg/ha
Kiwi	25-35 días antes del movimiento de yemas	14-18 kg/ha

Instrucciones de almacenaje y manipulación

No mezclar con otros productos con el fin de no alterar el efecto de la aplicación. Ante cualquier duda, consulte con nuestro Departamento Técnico o realice una prueba previa de compatibilidad.

Manténgase resguardado del sol y de la humedad.

Temperatura de almacenamiento: 5°C - 35°C.

En caso de derrame, limpiar la zona con agua y no verter al medio ambiente.