



EFISOIL Purín

CON DURAMON

**Mejorador nutricional de purines,
potenciador de la fertilidad del suelo
y del rendimiento de los cultivos**



**DURAMON® REDUCE Y CONTROLA LAS
PÉRDIDAS DE NITRÓGENO, LIBERÁNDOLO
DE FORMA GRADUAL Y POTENCIANDO SU
EFECTIVIDAD.**



**TRANSFORMA LA MATERIA ORGÁNICA EN
NUTRIENTES ASIMILABLES GRACIAS AL
APORTE DE BIOESTIMULANTES INDUCTORES
DE LOS PROCESOS MICROBIOLÓGICOS.**



**AUMENTA LA ACTIVIDAD MICROBIANA DEL
SUELO CAPAZ DE REGULAR Y BIOACUMULAR
NUTRIENTES, MINERALIZAR MATERIA
ORGÁNICA, Y DETOXIFICAR SUELOS.**



**ESTIMULA INTEGRALMENTE EL CULTIVO
GRACIAS AL APORTE DE AMINOÁCIDOS
SELECCIONADOS QUE MEJORAN LOS
PROCESOS METABÓLICOS, DE RESISTENCIA Y
NUTRICIONALES DE LA PLANTA.**



**INCREMENTA EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO
Y LA CALIDAD DE LAS COSECHAS
RESULTANTES.**



**UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE LOS
NUTRIENTES (REDUCCIÓN DEL LIXIVIADO DE
NITRÓGENO), PERMITE UN MEJOR
RENDIMIENTO CON MENOS APORTE Y UN
MAYOR RESPETO MEDIOAMBIENTAL.**

EFISOIL PURÍN es un producto diseñado para el **tratamiento de purines de cualquier tipo**, con el objetivo de **potenciar su eficiencia como fertilizante**, además de **estimular la actividad biológica del suelo y el desarrollo de los cultivos**. La tecnología incorporada actúa a través de un mecanismo múltiple: Bioestimulación específica de la actividad microbiana en purín y suelo, **aprovechamiento y control del nitrógeno (tecnología DURAMON®)**, incorporación de elementos secundarios esenciales y potenciación fisiológica del cultivo.

Con ello se obtiene una optimización de las características del purín, con una **mayor disponibilidad y eficiencia de los nutrientes**, **mejor transformación de la materia orgánica** en formas aprovechables, **mitigación de efectos adversos de antibióticos o metales pesados**, **incremento de la fertilidad del suelo**, así como **mayor desarrollo y resistencia de los cultivos**, mejorando las producciones y la calidad en las cosechas.

Además, los ensayos realizados con EFISOIL PURÍN* en cultivos como la pradera han demostrado una **reducción de hasta el 30% de la huella de carbono** frente a otros tratamientos convencionales.

* Cálculos de la huella ambiental del producto certificados bajo la norma EPD Process.

Denominación tipo: Abono especial de aminoácidos con micronutrientes

Contenido declarado

	p/p	p/v
Aminoácidos libres	6%	7.5%
Nitrógeno (N) total	6%	7.5%
Nitrógeno (N) orgánico	1%	1.25%
Nitrógeno (N) ureico	5%	6.25%
Trióxido de azufre (SO ₃) soluble en agua	14%	17.5%
Hierro (Fe) soluble en agua	3%	3.75%
Manganeso (Mn) soluble en agua	0.15%	0.187%
pH		1
Aminoácidos	Ala, Arg, Asp, Gly, Glu, Hyp, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Tyr, Val	


Patentes aplicadas al producto

- EP3561066B1
- EP3753915B1
- EP4306500A1

Dosis y modo de empleo

APLICACIÓN EN PURÍN: Puede aplicarse tanto en fondo como en cobertera de cultivos extensivos, forrajes o praderas. También en cultivos leñosos. La máxima efectividad se consigue con aplicación en presencia de cultivo o próxima a la siembra. Dosis de 10 a 20 l/ha incorporado en la cuba de aplicación del purín. Aplicar las dosis más altas en cultivos más exigentes en nutrición (regadíos, hortalizas, leñosos) o decaídos, así como en suelos pobres, arenosos o con limitaciones en aportes nitrogenados (zonas vulnerables).

Aplicar al principio del llenado de la cuba para una correcta mezcla con el purín y evitar la formación excesiva de espumas.



- 1 EFISOIL PURÍN
- 2 BALSA DE ALMACENAMIENTO DE PURINES
- 3 CUBA DE APLICACIÓN



DURAMON® (MCDHS) ES EL PRIMER INHIBIDOR DE LA UREASA CERTIFICADO EN EUROPA POR EL REGLAMENTO (UE) 2019/1009, BASADO EN SU EFICIENCIA DE INHIBICIÓN Y EN SU RESULTADO AGRONÓMICO.

Instrucciones de almacenaje y manipulación

Por su elevada concentración se recomienda agitar antes de usar. No mezclar con productos muy ácidos, con calcio ni ácido nítrico. No utilizar en ciruelos. Ante cualquier duda, consulte con nuestro Departamento Técnico o realice una prueba previa de compatibilidad.

Manténgase resguardado del sol y de la humedad.

Temperatura de almacenamiento: 5°C - 35°C.