



MICROQUEL Boromag

Corrector de boro y magnesio
para aplicación foliar



EL APOORTE CONJUNTO DE BORO Y MAGNESIO PERMITE SU USO TANTO COMO PROTECTOR COMO CURATIVO FRENTE A LOS SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA DE ESTOS NUTRIENTES.



MEJORA LAS FASES DE FLORACIÓN, FRUCTIFICACIÓN Y ENGORDE DE FRUTOS GARANTIZANDO UNA MEJOR COSECHA.



CONTRIBUYE A LOS PROCESOS DE FOTOSÍNTESIS FAVORECIENDO EL TRANSPORTE DE NUTRIENTES EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.



TRANSFIERE A LA DISOLUCIÓN PROPIEDADES MOJANTES, HUMECTANTES Y PERSISTENTES. MEJORANDO SU EFICIENCIA.

MICROQUEL BOROMAG es un fertilizante hidrosoluble diseñado para **prevenir y corregir de forma eficiente las posibles carencias de boro y magnesio**, manteniendo un adecuado balance nutricional en las plantas. Es un producto con una excelente solubilidad y eficacia y es compatible con la mayoría de los fitosanitarios.

El boro interviene en los **procesos de floración, germinación del polen y fructificación**, ya que influye en el alargamiento del tubo polínico y en consecuencia la fecundación del ovario, que dará lugar a los frutos. Además, ayuda a **evitar la caída de los frutos inmaduros, además de necrosis, agrietamientos y deformación de frutos, y así garantizar una cosecha de calidad.**

Por otro lado, el magnesio es el componente principal de la clorofila y como tal es un elemento indispensable para la fotosíntesis, responsable de aportar una excelente vegetación de verde intenso al cultivo. También es un nutriente que interviene en la síntesis y formación de proteínas contribuyendo en varios procesos metabólicos básicos de la planta. La deficiencia de magnesio puede ser un factor importante que limita la producción de nuestros cultivos.

La aplicación de BOROMAG será desde arranque vegetativo del cultivo hasta cuajado, poniendo así el árbol en condiciones para obtener un mayor número de frutos.

Denominación tipo: Mezcla sólida de boro y magnesio

Contenido declarado

	p/p
Boro (B) soluble en agua	10%
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua	6%

Patentes aplicadas al producto

- EP4306500A1

Dosis y modo de empleo

Realizar en 2-3 aplicaciones durante la brotación y después del cuajado de frutos.

Cultivo	Dosis Foliar
Frutales y cítricos	200-250 g/hl
Olivar	200-300 g/hl
Hortícolas y fresón	100-200 g/hl

Instrucciones de almacenaje y manipulación

Evitar tratamientos con temperaturas elevadas. No mezclar con productos alcalinos ni con calcio. Ante cualquier duda, consulte con nuestro Departamento Técnico o realice una prueba previa de compatibilidad.

Manténgase resguardado del sol y de la humedad.

Temperatura de almacenamiento: 5°C - 35°C.