

SOLUCIONES DE BIOCONTROL PARA LOS CULTIVOS

# Protocolo de aplicación

KIWI



|                                              | Yemas invernales<br>Desborre                                                    | Aparición botones florales<br>Floración | Cuajado<br>Maduración                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moteado</b><br>"Venturia Inaequalis"      | Ecopper 3cc/l<br>Leciactiv 3cc/l<br>○<br>Bicarbactiv 5-10g/l<br>Leciactiv 3cc/l | Vensiactiv 5-7cc/l<br>Leciactiv 3cc/l   | Ecopper 3cc/l<br>Vensiactiv 5-7cc/l<br>(Provoca Russeting)<br>○<br>Bicarbactiv 5-10g/l<br>Leciactiv 3cc/l |
| <b>Oídio</b><br>"Podosphaera<br>Leucotricha" | Sulfasol 2,5cc/l<br>○<br>Bicarbactiv 5-10g/l<br>Leciactiv 3cc/l                 |                                         |                                                                                                           |
| <b>Carpocapsa</b><br>"Cydia Pomonella"       |                                                                                 |                                         | Ortiactiv 5cc/l                                                                                           |
| <b>Pulgón</b><br>"Alphis Pomi"               |                                                                                 |                                         | Leciactiv 3cc/l                                                                                           |

\* Los productos recomendados en esta tabla no se consideran fitosanitarios. Se aconseja utilizarlos en combinación con los tratamientos habituales.

## Descripción de los productos recomendados

| Productos                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presentación  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Formulado de cobre de tercera generación que garantiza la más alta liberación de ión $\text{Cu}^{2+}$ en la superficie de la planta con una muy baja concentración de cobre. Este formulado permite aprovechar más cada unidad de cobre aplicada en el cultivo sin riesgo de toxicidad y residuos.             | Líquido       |
|    | Lecitina de soja concentrada en ácido fosfatídico para reforzar la pared celular y fosfoglicéridos para crear una capa lipídica protectora. Su acción combina efectos indirectos internos y externos a las plantas que ralentizan la progresión de enfermedades fúngicas y potencia los efectos de fungicidas. | Líquido       |
|    | Decocción de <i>equisetum arvense</i> concentrada en varios compuestos orgánicos que actúan directa e indirectamente sobre los hongos patógenos para prevenir la infección por todo tipo de enfermedades y así aportar la máxima flexibilidad en tratamientos fúngicos preventivos.                            | Líquido       |
|    | Decocción de ortiga concentrada en varios compuestos orgánicos que dificulta el reconocimiento del cultivo como alimento para las plagas para un efecto repelente duradero sin afectar ninguna propiedad de la cosecha.                                                                                        | Líquido       |
|   | Azufre sistémico de baja concentración en forma de compuestos tiólicos de fácil asimilación por los cultivos que permite su eficacia tanto en aplicaciones foliares como en fertirriego.                                                                                                                       | Líquido       |
|  | Formulado de hidrogeno carbonato de sodio que provoca una reacción alcalina y libera $\text{CO}_2$ en niveles óptimos para ser tóxicos para el desarrollo del micelio y las esporas de hongos presentes en la filosfera sin provocar toxicidad en los cultivos.                                                | Polvo mojable |